

毒伞中毒八例报告

清原县食品卫生监督检验所 于德泗
清原县卫生防疫站 田宝安
抚顺市卫生防疫站 徐玉燕

本文对清原县大苏河乡信贷员王××和邻居王××两家因误食毒伞八人,六人致死的严重事件做了调查,现报告如下:

有两例七月十八日晚进食,十九日上午七时左右两例相续死亡,余下六人相续住院治疗,后又转入县医院治疗期间又死亡四人。

中毒最长潜伏期 18 小时,最短潜伏期 12 小时,平均潜伏期 13.5 小时。

八例中毒患者普遍有严重的胃肠道症状,恶心,频繁呕吐,呕吐物呈咖啡样,腹痛、腹泻、稀水样便,其中有五例 24 小时后胃肠道症状好转,缓解 24—48 小时后又出现了腹痛,全身肌肉疼痛,进行性肝肿大、质硬有压痛,化验肝功有明显改变,并伴有头痛、头晕、昏迷、少尿、血尿、尿闭、黄疸、烦躁不安、神志不清、抽搐、血压下降、心律快。

经调查八例中毒者,喝毒蘑菇汤的六例全部死亡,吃的量少又不喝汤的两例治愈。

尸体剖检主要病理所见:

1、急性中毒性肝坏死(急性肝萎缩)。

2、实质器官变性(神经细胞变性、胰腺上皮、肾上腺束状带细胞、肾近曲管上皮变性、胃粘膜糜烂)。

3、多发性出血(口鼻出血、皮肤淤血、右大脑半球顶叶及后部出血(6×3Cm)蛛网膜下腔出血,脉络丛出血、肝脏出血、胸膜下、肾被膜下出血)。腹腔内均有 300 毫升黄色透明的渗出液。肾脏肿大近正常的一至二倍呈灰白色。

4、各脏器小血管充血、淤滞。

5. 急性肠系膜淋巴腺炎,淋巴细胞反应性增生。

从临床经过看患者都有 1—2 日假愈期,随出现肝、肾及中枢神经系统的损害症状、表现为黄疸、肝脏肿大、血尿、尿闭、神志不清、反复抽搐、出现急性肝萎缩、昏迷死亡。从生态环境和中毒后的潜伏期及临床症状看与当地群众称之为蹬腿蘑的毒伞相当相似,为弄清真相,中毒患者宋××治愈后由其领着上山采集毒蘑菇,据其所采集的毒蘑菇形态特点看、菌托较厚,灰褐色,菌盖灰白色、园柱形、空心较脆易坏损,稍粘呈多液状,基部菌托膨大等形态特点。宋××肯定的说就是这样的蘑菇,经我们鉴定为毒伞野蕈,溶血试验阳性,为普及和推动毒伞普查工作,建议有关单位能提供检验方法。

秋生盔孢伞中毒调查报告

张树溪³ 臧雪冰³ 彭继岩¹ 毕兆和¹ 黄生余¹ 梁元春² 李生元² 向清华²

1990年4月中旬,有6例中毒患者因共食用焦脚菇,均在食后18小时发病,其中男